

Conférence



Boom

Groeit middelsterk. Gesteltakken steil- en schuinopstaand, voldoende vertakt ; zijtakken gedeeltelijk horizontaal, later hangend.

Vruchthout dicht bezet met sporen en stekeltwijgen. Vorm van de kruin hoogpiramidaal, na de vormsnoei blijven controleren, tijdig verjongen.

Op alle standplaatsen, op voedzame gronden met voldoende vocht.

Bloei

Vroeg

Gezondheid

Conference is tamelijk vatbaar voor loodglans, takschurft en bacterievuur en weinig tot tamelijk vatbaar voor schurft op het blad.

Pluk

De pluk valt vanaf de tweede week van september. Vlak voor de pluk kunnen de vruchten al van de boom vallen. Het voordeel van dit ras is de lange afzetperiode, omdat het lang bewaard kan worden en tijdens de bewaring de smaak behouden blijft.

Gebruik

Handpeer

Vrucht

Middelgroot tot groot. Vorm lang tot extreem lang peer-, flesvormig, midden- tot kelkbuikig, steelwaarts kegelvormig, versmald ; vruchtzijden meestal symmetrisch, glad

Vruchtvlees

Vlak onder de schil groenachtig tot geelachtig wit, naar het klokhuis toe zalmgeel, zacht, volsmeltend, suikermeloenachtig, zeer sappig, zoet, nauwelijks zurig, kruidig

Kelk

Kelk middelgroot tot groot, open. Kelkholte vlak, nauw, iets bultig, ook wel ontbrekend

Schil

Glad, soepel, indien beroest ruw, dik, vast, korrelig stippels op de schil klein, bruin, weinig opvallend; beroesting grauwbrown, vlekkelig, rond de kelk ook aaneengesloten plekken.

Herkomst

Engeland, gekweekt door de kwekerij Rivers and Son in Sawbridgeworth. 1e vrucht in 1884, tentoongesteld en genoemd naar het Pomologisch Congres in Chiswick, in de proeftuinen van het Koninklijk tuinbouwgenootschap gehouden in 1885 en onderscheiden met het certificaat : klasse 1 sedert 1894 in de handel.